

FLOW NON-OCCUPATIONAL PEP (n-PEP)

การป้องกันการติดเชื้อ HIV ที่ไม่เกิดจากการทำงาน

จุดคัดกรอง

01

ลงทะเบียน

02

ห้องตรวจ

พบแพทย์/พยาบาล

03

ห้อง LAB

04

ห้องจ่ายยา

05

ห้องตรวจ

วันราชการ	- เวลา 08.00-16.00 น.	ห้องตรวจเบอร์ 4
	- เวลา 16.00-08.00 น.	ห้องฉุกเฉิน
วันหยุดราชการ	- ตลอด 24 ชั่วโมง	ห้องฉุกเฉิน

พยาบาล

ซักประวัติ ระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ (การให้ PEP ที่มีประสิทธิภาพให้ได้รับยาเร็วที่สุดและไม่เกิน 72 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุการณ์)

ประเมินความเสี่ยง No condom Condom หลุด/แตก ไม่แน่ใจ อื่นๆ

ประวัติผลเลือดของผู้ Anti-HIV Positive ไม่ทราบผลเลือด

แนะนำให้พาคู่มาตรวจด้วย Pre-Post counseling ตามมาตรฐาน ก่อน-หลังทราบผลเลือด
ส่งตรวจLAB ก่อนพบแพทย์ (ฟรีKey เบิกจากNAP nPEP)

: ANTIHIV, HBsAg, ANTIHBs, ANTIHCV, VDRL, Cr, ALT, UPT

ส่งห้องอนุมัติสิทธิก่อนไปเจาะเลือด

พบแพทย์

สูตรยา nPEP คือ Truvada 1*1 O OD และ DTG (50 mg) 1*1 # 30 เม็ด

โดยให้ tart dose (Truvada 1 tab + DTG 1 tab) (ยาฟรี Key เบิกจาก NAP nPEP)

หลังพบแพทย์ : ส่งรับยาที่ห้องยา

นัดติดตามต่อเนื่อง : คลินิกพิเศษเฉพาะโรค (ห้องตรวจ211) เวลา10.00-14.00น. ส่งตรวจ Anti-HIV, VDRL, พบแพทย์

แนวทางการดูแล Non-occupational PEP โดยพยาบาลที่คลินิกพิเศษเฉพาะโรค หลังเริ่มยา

- ครบ 1 เดือน ติดตามตรวจ Anti-HIV, VDRL หลังได้รับยา
- เดือน3, และ เดือน 6: Counseling for stay negative(ผลเลือดลบ)
- ผลเลือดบวก นัดพบแพทย์เข้าสู่ระบบการรักษา
- กรณี MSM นัดติดตาม 3 เดือน เจาะ Anti-HIV, VDRL, Anti-HCV