


## แนวทางการให้คำปรึกษาเพื่อการตรวจเลือดเอชไอวีและการส่งต่อเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษา



\*CITC : client-initiated testing and counseling ผู้รับบริการเป็นผู้เริ่มต้นกระบวนการต้องการตรวจหาการติดเชื้อด้วยตัวเอง

PITC: provider-initiated testing and counseling ผู้ให้บริการเป็นผู้เริ่มต้นกระบวนการ

\*\*กรณีผล inconclusive ติดตามเจาะ HIV Viral load นัดฟังผลเลือด พบแพทย์ 1 สัปดาห์ if < 40 copies/ml FU เจาะ ANTI HIV ซ้ำอีก 3 เดือน

\*\*\* กรณีที่ผู้ติดเชื้อ HIV ที่มี CD<sub>4</sub> > 500 cell/mm<sup>3</sup> ได้รับการให้คำปรึกษาเรื่องยาต้านไวรัสแล้ว มีความเข้าใจ แต่ยังไม่พร้อมที่จะเริ่ม ART counseling ซ้ำ

(ค้นหาปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่พร้อมเริ่มยาและวางแผนร่วมกับผู้ป่วย) นัดติดตาม CD<sub>4</sub> ทุก 3 – 6 เดือน

สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่มีเชื้อ HIV และทารก ให้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก

สำหรับเด็กและวัยรุ่นที่มีเชื้อ HIV ให้ปฏิบัติตามคู่มือ “การดูแลเด็กที่ติดเชื้อฯ”