

ข้อห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา

- ❌ ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ผลิตภัณฑ์กัญชา
- ❌ ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
ขั้นรุนแรง หรือไม่สามารถควบคุมอาการได้
รวมถึงผู้มีปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ
- ❌ ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคจิตมาก่อน หรือมี
อาการของโรคอารมณ์แปรปรวน หรือโรค
วิตกกังวล (ยกเว้น ตำรับที่มี CBD เท่านั้น)
- ❌ ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ หรือให้นมบุตร

ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา

- ❌ ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะ
- ❌ ไม่ควรทำงานกับเครื่องจักรกล
- ❌ หลีกเลี่ยงการใช้กัญชาพร้อมกับแอลกอฮอล์
เก็บยาในที่ปลอดภัยให้พ้นมือเด็ก

อาการที่ควรลดขนาดการใช้



มึน/ เวียนศีรษะ



ร่างกายเสียความสมดุล



หัวใจเต้นเร็วขึ้น/ ช้าลงได้



ความดันโลหิตผิดปกติ
(สูง/ต่ำกว่าปกติ)

อาการที่ควรหยุดใช้



สับสน



กระวนกระวาย



วิตกกังวล



ประสาทหลอน



โรคจิต

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกัญชาทางการแพทย์

www.medcannabis.go.th



ข้อแนะนำ

การใช้

ผลิตภัณฑ์

กัญชา

ทางการแพทย์

จัดทำโดย คลินิกกัญชาทางการแพทย์

รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ จ. เชียงราย



ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์

ของประเทศไทย มีทั้งผลิตภัณฑ์กัญชา

สำหรับ การแพทย์แผนปัจจุบัน

ซึ่งอยู่ในรูปแบบ สารสกัดน้ำมันกัญชา

สำหรับหยุดไต้ลื่นเพื่อให้ดูดซึม

ในช่องปาก โดยมีปริมาณสารสำคัญ

THC และ CBD ในความเข้มข้นและ

อัตราส่วนต่างๆกัน

เพื่อให้ครอบคลุมการรักษาโรคหรือภาวะ

ของโรคที่หลากหลาย



นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์

ตำรับยาแผนไทย

ที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม เช่น ยามง

ยาลูกกลอน เพื่อใช้สำหรับการแพทย์

แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านอีก

ข้อบ่งใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา

กลุ่มโรคที่มีข้อมูลชัดเจน
ว่าได้ประโยชน์ในการรักษา

ภาวะคลื่นไส้อาเจียน ในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด

โรคลมชัก ที่รักษายาก หรือที่ดื้อยา

ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง ในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง

ภาวะปวดประสาท ที่ใช้วิธีการรักษาอื่นๆแล้วไม่ได้ผล

กลุ่มโรคที่น่าจะได้ประโยชน์
ในการควบคุมอาการ

โรคพาร์กินสัน

โรคปลอกประสาทอักเสบ

โรคอัลไซเมอร์

โรควิตกกังวล

ผู้ป่วยที่ต้องดูแลแบบประคับประคอง

ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

กลุ่มโรคที่อาจจะมีประโยชน์ในการรักษา
แต่ยังขาดข้อมูลที่ชัดเจน ซึ่งต้องศึกษาวิจัยต่อไป

โรคมะเร็งชนิดต่างๆ

3 สิ่งที่ผู้ป่วยเริ่มใช้สารสกัดกัญชาควรทราบ

1. จำเป็นต้องทราบข้อมูลก่อนการรักษา

- สารสกัดกัญชาไม่ใช่ทางเลือกแรกในการใช้รักษา
- ใช้รักษาเสริมจากการรักษาตามมาตรฐาน
- ไม่หยุดการรักษาที่รับอยู่ในปัจจุบัน
- ผู้ป่วยต้องทราบประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- ควรใช้สารสกัดกัญชาที่ได้มาตรฐาน และทราบ อัตราส่วนสารสำคัญ (THC และ CBD) ที่ชัดเจน

2. เมื่อเริ่มใช้สารสกัดกัญชา

- ควรเริ่มในปริมาณน้อยที่สุด หากยังไม่ได้ผลต้อง ปรับเพิ่มปริมาณช้าๆ
- ควรมีผู้ดูแลอยู่ด้วยเมื่อเริ่มใช้ หากเกิดผลข้างเคียง ให้รีบนำผู้ป่วยพบแพทย์ทันที

3. แจ้งให้แพทย์ทราบว่าใช้ยาประเภทใดอยู่

เพราะสารสกัดกัญชาอาจส่งผลกระทบต่อยาบางชนิดที่ผู้ป่วยใช้ ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้

